

Electro-Reto

Respuesta al ECG de febrero de 2016



Response to ECG, February 2016

Reyes Álvarez García-Rovés

Servicio de Cardiología Pediátrica, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España

La taquicardia ectópica de la unión posquirúrgica (QRS estrecho con disociación auriculoventricular y mayor frecuencia ventricular que auricular) es autolimitada. Suele controlarse disminuyendo la frecuencia cardiaca con hipotermia moderada y descenso de inotrópicos, y recuperando la sincronía auriculoventricular mediante estimulación auricular o secuencial auriculoventricular. En nuestro paciente, la taquicardia no respondió a las medidas habituales ni tampoco a la amiodarona, y provocó una afectación hemodinámica grave. El paciente precisó soporte con oxigenador extracorpóreo de membrana durante 72 horas, plazo en que se resolvió la taquicardia ectópica, con posterior destete y buena evolución.

VÉASE CONTENIDO RELACIONADO:

<http://dx.doi.org/10.1016/j.recesp.2015.09.020>

Correo electrónico: reyesagr@hotmail.com

Full English text available from: www.revespcardiol.org/en

<http://dx.doi.org/10.1016/j.recesp.2015.09.021>

0300-8932/© 2015 Sociedad Española de Cardiología. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.